

QCM n° 1

Parmi les éléments suivants constituant le score CHADS 2, lequel compte pour deux points ? :

- 1) AVC ou AIT (antécédents) ;
- 2) Age > 75 ans ;
- 3) Hypertension ;
- 4) Diabète ;
- 5) Insuffisance cardiaque.

QCM n° 2

Dans les recommandations de 2007 de la Société Européenne d'Hypertension Artérielle, il est attribuée une valeur normale aux chiffres tensionnels suivant leur modalités de mesure, parmi les propositions suivantes quelles sont les bonnes ? :

- 1) La valeur normale des chiffres tensionnels mesurés au cabinet médical est inférieure à 140/90 mmHg ;
- 2) La valeur normale des chiffres tensionnels des 24 heures mesurés par mesure ambulatoire de pression artérielle est inférieure à 130/80 mmHg ;
- 3) La valeur normale des chiffres tensionnels de jour, mesurés par mesure ambulatoire de pression artérielle est inférieure à 135/85 mmHg ;
- 4) La valeur normale des chiffres tensionnels de nuit mesurés par mesure ambulatoire de pression artérielle est inférieure à 120/70 mmHg ;
- 5) La valeur normale des chiffres tensionnels mesurés par automesure est inférieure à 135/85 mmHg.

QCM n° 3

Parmi les propositions suivantes, issues des recommandations de 2007 de la Société Européenne de Cardiologie pour l'angioplastie coronaire, quelles sont celles qui sont fausses ? :

- 1) Dans l'angor stable, en cas d'angioplastie coronaire avec un stent nu, la bithérapie aspirine-clopidogrel est proposée pendant un mois ;
- 2) Dans l'angor stable, en cas d'angioplastie coronaire avec un stent actif, la bithérapie aspirine-clopidogrel est proposée pendant douze mois ;
- 3) Dans l'angor instable, en cas d'angioplastie coronaire avec un stent nu, la bithérapie aspirine-clopidogrel est proposée pendant un mois ;
- 4) Dans l'angor instable, en cas d'angioplastie coronaire avec un stent nu, la bithérapie aspirine-clopidogrel est proposée pendant douze mois ;
- 5) Dans l'angor instable, en cas d'angioplastie coronaire avec un stent actif, la bithérapie aspirine-clopidogrel est proposée pendant douze mois ?

QCM n° 4

Parmi les propositions suivantes caractérisant les résultats disponibles de l'étude ADVANCE, lesquelles sont exactes ? :

- 1) Seuls des diabétiques de type 2 ont été inclus ;
- 2) Seuls des sujets en prévention secondaires de la maladie coronaire ont été inclus ;
- 3) Il n'y a pas eu de différence significative de la pression artérielle systolique entre les groupes comparés durant l'essai ;
- 4) Sous un traitement associant un IEC et un diurétique en association fixe il est mis en évidence une réduction significative de la mortalité totale ;
- 5) Sous un traitement associant un IEC et un diurétique en association fixe il est mis en évidence une réduction significative de la mortalité cardiovasculaire