

Réponses aux QCM du n° 308

- QCM n° 1** Parmi les critères suivants, quel est celui qui ne fait pas partie des recommandations de grade 1 et de niveau A pour l'implantation d'un stimulateur multisites dans l'insuffisance cardiaque ?
- 1) Une fraction d'éjection inférieure à 35 %.
 - 2) Une insuffisance cardiaque de stade NYHA III à IV.
 - 3) Une dynssynchronie échocardiographique.
 - 4) Une durée de QRS supérieure ou égale à 120 ms.
 - 5) Un rythme sinusal.

- QCM n° 2** Parmi les données disponibles concernant la dronédarone, quelles sont les propositions exactes ?
- 1. Elle doit être utilisée en deux prises par jour.
 - 2. Comparativement au placebo, elle permet de prévenir les récurrences de fibrillation et de flutter auriculaire.
 - 3. Elle n'a pas encore été évaluée à grande ampleur contre un autre anti-arythmique.
 - 4. Elle est associée à un excès de mortalité chez les patients ayant une insuffisance cardiaque.
 - 5. L'agence européenne du médicament a accepté sa commercialisation en 2007.

- QCM n° 3** Parmi les propositions suivantes concernant l'étude COURAGE, quelles sont les propositions exactes ?
- 1. Elle a été effectuée chez des patients ayant une maladie coronaire stable.
 - 2. Elle a été conduite chez des patients dont le risque d'infarctus du myocarde est faible, c'est-à-dire inférieur à 1 % par an.
 - 3. Elle a montré que l'angioplastie coronaire permet de diminuer le risque d'infarctus du myocarde.
 - 4. Elle a montré que l'angioplastie coronaire permet de diminuer la mortalité totale.
 - 5. Elle a montré qu'au terme de 5 ans de suivi, l'angioplastie coronaire permet de diminuer significativement les crises d'angor.

- QCM n° 4** Parmi les indications suivantes des stents actifs, quelles sont celles qui sont approuvées en France ?
- 1. Patient diabétique.
 - 2. Lésion de petit vaisseau (moins de 3 mm de diamètre).
 - 3. Lésions longues (de plus de 15 mm de long).
 - 4. Sténose de l'interventriculaire antérieure proximale.
 - 5. Resténose intrastent clinique (c'est-à-dire avec réapparition de symptômes ischémiques conduisant à une nouvelle revascularisation de l'artère), à l'exclusion de la resténose intrastent enrobé de produit actif pharmacologiquement.